



**EDSS: Expanded Disability Status Scale**

EDSS steps 1.0 to 4.5 refer to people with MS who are fully ambulatory. EDSS steps 5.0 to 9.5 are defined by the impairment to ambulation.

**0.0:** Normal Neurological Exam

**1.0:** No disability, minimal signs on 1 FS

**1.5:** No disability minimal signs on 2 of 7 FS

**2.0:** Minimal disability in 1 of 7 FS

**2.5:** Minimal disability in 2 FS

**3.0:** Moderate disability in 1 FS; or mild disability in 3 - 4 FS, though fully ambulatory

**3.5:** Fully ambulatory but with moderate disability in 1 FS and mild disability in 1 or 2 FS; or moderate disability in 2 FS; or mild disability in 5 FS

**4.0:** Fully ambulatory without aid, up and about 12hrs a day despite relatively severe disability. Able to walk without aid 500 meters

**4.5:** Fully ambulatory without aid, up and about much of day, able to work a full day, may otherwise have some limitations of full activity or require minimal assistance. Relatively severe disability. Able to walk without aid 300 meters

**5.0:** Ambulatory without aid for about 200 meters. Disability impairs full daily activities

**5.5:** Ambulatory for 100 meters, disability precludes full daily activities

**6.0:** Intermittent or unilateral constant assistance (cane, crutch or brace) required to walk 100 meters with or without resting

**6.5:** Constant bilateral support (cane, crutch or braces) required to walk 20 meters without resting

**7.0:** Unable to walk beyond 5 meters even with aid, essentially restricted to wheelchair, wheels self, transfers alone; active in wheelchair about 12 hours a day

**7.5:** Unable to take more than a few steps, restricted to wheelchair, may need aid to transfer; wheels self, but may require motorized chair for full day's activities

**8.0:** Essentially restricted to bed, chair, or wheelchair, but may be out of bed much of day; retains self care functions, generally effective use of arms

**8.5:** Essentially restricted to bed much of day, some effective use of arms, retains some self care functions

**9.0:** Helpless bed patient, can communicate and eat

**9.5:** Unable to communicate effectively or eat/swallow

**10.0:** Death due to MS

0= normaali neurologinen tutkimustulos

1-3,5= Vähäisiä neurologisia löydöksiä, kävelykyky normaali

4= ilman apuvälineitä ja levähtämättä kävelee väh.500m yhtäjaksoisesti

4,5= ilman apuvälineitä ja levähtämättä kävelee väh.300m yhtäjaksoisesti

5,0= sama kuin edellä väh.200 m yhtäjaksoisesti

5,5= sama kuin edellä väh.100m yhtäjaksoisesti

6,0= kävelee yhtä tukikeppiä käyttäen välillä levähtäen tai levähtämättä väh.100m yhtäjaksoisesti

6,5= kahta tukisauvaa käyttäen kävelee levähtämättä väh.20m yhtäjaksoisesti

7,0= kävelee kork.5m käyttäen apuvälinettä,pyörätuoli

7,5= kävelee kork.pari askelta,saattaa tarvita apua pyörätuoliin siirtyessä

8,0= pystyy istumaan pyörätuolissa,yläraajojen toiminta kohtalainen

8,5= vuodepotilas,yläraajojen toiminta rajoittunut

9,0= autettava vuodepotilas,kommunikointi ja nieleminen onnistuvay

9,5= täysin autettava vuodepotilas,kommunikaatio ja nieleminen vaikeutuneet

10= MS-tautiin liittyvä kuolema